

## Lexique

**Bouquet** : Groupe d'arbres de dimension et d'âge voisin occupant une surface comprise entre 20 et 50 ares.

**Climax / Forêt climaxique** : Groupement (ensemble des essences climaxiques) vers lequel tend la végétation d'un lieu dans des conditions naturelles constantes, en l'absence de l'intervention de l'homme.

**Clouonnement** : Ouverture linéaire réalisée à intervalles réguliers dans un peuplement pour faciliter les travaux d'entretien ou les exploitations et leur mécanisation. En général, 4 à 5 mètres de large espacés de 10 à 35 mètres.

**Conversion** : Opération sylvicole consistant à passer du régime du taillis (peuplement renouvelé par rejets) à celui de la futaie (obtention de semis à partir du peuplement vieilli).

**Coupe d'amélioration** : Terme générique regroupant toutes les coupes qui ont pour objet d'améliorer le peuplement par élimination des tiges de moindre valeur.

**Coupe sanitaire** : Coupe légère destinée à prélever les arbres malades ou déperissants. Généralement ces coupes concernent des peuplements arrivés à maturité, mais devant être maintenus sur pied au-delà de l'âge d'exploitabilité (ou du diamètre objectif) ou des peuplements à croissance réduite sur stations limites. Attention les coupes fortes justifiées pour des raisons sanitaires doivent être qualifiées différemment : extraction, régénération, etc selon leur intensité.

**Coupe de rajeunissement** : Coupe rase réalisée sur les taillis, destinée à perpétuer le peuplement par émission de rejets de souche.

**Coupe rase** : Coupe en une seule fois de la totalité du peuplement.

**Coupes de régénération** : Regroupe toute les coupes permettant de régénérer naturellement un peuplement traité en futaie.

On distingue :

- La régénération par coupes progressives, une coupe d'ensemencement (maintien de 50 à 200 semenciers par hectare) est suivie par une ou plusieurs coupes secondaires, puis une coupe définitive (extraction totale).
- La régénération par ouverture de trouées ou bandes dans le peuplement.

**Dégagement** : Opération culturale ayant pour but de supprimer ou d'affaiblir toute végétation susceptible de gêner le développement de semis ou jeunes plants objectifs.

**Détourage** : Eclaircie localisée autour des plus beaux sujets.

**Dépressage** : Le dépressage vise à abaisser la densité d'un jeune peuplement dont la hauteur des tiges dominantes est généralement inférieure à 9 mètres, par suppression et abandon sur place des tiges de moindre croissance ou de forme déficiente.

**Dominant, codominant et dominé** : Les arbres dominants sont les arbres les plus vigoureux des peuplements, dont les houppiers sont les plus hauts et qui concurrencent les houppiers des arbres codominants et dominés. Les codominants sont les arbres dont le houppier se trouve dans l'étage dominant, mais est concurrencé (comprimé) par celui des sujets les plus vigoureux. Les arbres dominés sont les arbres les moins vigoureux dont le houppier est situé au dessous de ceux des arbres dominants.

**Dryade** : Essence d'ombre à longue durée de vie.

**Eclaircies** : Réduction de la densité d'un peuplement non arrivé à maturité en vue d'améliorer la croissance des arbres objectifs restants. Les produits ligneux exploités sont en général utilisables.

On distingue les éclaircies :

- Par le bas, élimination d'arbres dominés.
- Par le haut, élimination d'arbres dominants et codominants.

**Essence objectif** : Essence au profit de laquelle sont orientées les interventions sylvicoles.

**Hauteur dominante** : Hauteur moyenne des 100 plus gros arbres par hectare.

**Nettoisement** : Sélection de brins de cépées dans les taillis sans objectif de conversion.

**Parquet** : Grand bouquet de 50 ares à 1 hectare.

**Régime** : Mode de renouvellement qui permet de perpétuer la forêt.

On distingue :

- La futaie, issue de graine. Ce terme peut être appliqué aux taillis vieillissants en cours de conversion, dont le vieillissement conduit parfois à obtenir une futaie sur souche.
- Le taillis, issu de rejets de souche, après coupe de rajeunissement.

**Régulier / Irrégulier** (peuplement) : On distingue :

- Les peuplements réguliers dont les arbres ont à peu près les mêmes dimensions et le même âge.
- A contrario, les peuplements irréguliers.

Cette irrégularité peut être par bouquets ou en mélange pied à pied.

**Semenciers** : Arbres conservés pour la reproduction. En général, arbres en bon état végétatif, à houppiers développés et assez stables pour supporter l'isolement après la coupe d'ensemencement.

**Surface terrière** : Elle correspond à la surface des sections transversales des troncs à 1,30 mètre du sol. On l'exprime en m<sup>2</sup> par hectare.

**Tiges d'avenir** : Arbres au profit desquels sont orientées les interventions sylvicoles. En général, arbres droits, élancés, présentant un houppier développé et équilibré. Ils doivent aussi être jeunes (<60 ans) pour pouvoir réagir aux interventions.

**Traitement** : Suite des opérations sylvicoles destinées à diriger l'évolution des peuplements :

- Les traitements irréguliers visent à obtenir des peuplements irréguliers. Ils sont associés souvent à la notion de coupe de jardinage.
- Les traitements réguliers visent à obtenir des peuplements réguliers.

**Transformation** : Traitement qui se traduit par un changement de l'essence objectif, et éventuellement par un changement de régime. Exemple : Boisement d'un taillis.

**Trouée** : Ouverture pratiquée dans un peuplement dont le diamètre est équivalent à 2 ou 3 fois la hauteur du peuplement.

